

Informed Consent ; Sterilisatie

U heeft er voor gekozen een sterilisatie of te wel vasectomie te ondergaan in onze praktijk. Deze ingreep wordt gedaan door Dr. Plasmans met ondersteuning van een assistente.

Wat is een vasectomie

Bij het intake gesprek is met u de procedure besproken.

Samenvattend is een vasectomie een operatieve ingreep waarbij de zaadleider wordt onderbroken en dicht gebrand. De ingreep is in principe onherroepelijk. Een vasectomie is dan ook alleen een goede keuze, als u zeker weet dat u geen kinderen (meer) wilt. Een sterilisatie heeft geen invloed op uw seksleven.

Vorbereiding

Om infectie te voorkomen, wordt u verzocht de avond voor de ingreep (en niet op de dag zelf) de beharing van de balzak zorgvuldig weg te scheren.

U hoeft niet nuchter te zijn voor de ingreep !

Bloed verdunnende geneesmiddelen kunnen met de nieuwe No Scalpel techniek gewoon gebruikt blijven worden .

Neem een extra strak zittende onderbroek of zwembroek mee naast het gewone ondergoed.

Als u deze de eerste 24 uur na de ingreep aanhoudt verkleint u de kans op een vervelende nabloeding.

Operatie

Onder plaatselijke verdoving maakt de dokter een kleine opening links en rechts in de balzak. Van beide zaadleiders wordt vervolgens een stukje verwijderd en de uiteinden worden dicht gebrand .

De huid van de balzak wordt niet gesloten met een hechting omdat met de No Scalpel

Techniek er een natuurlijke opening gecreëerd wordt die heel snel spontaan sluit.

De ingreep duurt ongeveer 20 minuten.

Complicatierisico

Sterilisatie van de man is een snelle, effectieve en veilige methode om uw vruchtbaarheid te stoppen. Met u is besproken dat er kleine risico's verbonden zijn aan de ingreep. Tijdens de operatie kan een bloedvat worden geraakt zodat er een inwendige bloeding optreedt (kans 1%). Als deze bloeding onverwacht groot blijkt te zijn kan tot enige weken van ongemak leiden. Het herstelt echter altijd volledig. Zeer zelden (kans 0.1%) is het hiervoor nodig een diepe hechting te leggen wat soms tot gevolg kan hebben dat de testikel aan die kant kleiner wordt (testikelatrofie). Het kan voorkomen (kans <1%) dat er een infectie optreedt. Als dat gebeurt dan kan deze goed worden behandeld met antibiotica en enkele dagen rust. Een klein percentage van de mannen die een vasectomie hebben ondergaan hebben gedurende een langere periode (max 6 weken) last van een zeurend gevoel in het operatiegebied ("scrotalgie"). Dit kan verschillende oorzaken hebben en verdwijnt altijd restloos.

De nieuwe No Scalpel Techniek die nu gebruikt wordt is sneller ; prettiger (minder pijn bij de ingreep) en veiliger (minder complicaties dan boven beschreven).

Na de ingreep thuis

De kans op een nabloeding is erg klein maar kan verminderd worden door de rest van de dag rustig aan te doen en het strakke ondergoed danwel ondergoed en zwembroek te dragen.

